



Thaumetopoea processionea

Batch: 10768/13894

D.o.M: 22/04/2024



MODE D'EMPLOI



Phéromone sexuelle qui permet de réduire progressivement la population en diminuant le nombre d'accouplements par la capture des papillons mâles.

Leurre standard 10 mg

Durée de vie active :
4-6 semaines (en fonction de la température)



SURVEILLANCE

Adultes présents de juillet à septembre.

DENSITÉ RECOMMANDÉE DES PIEGES

1 pour 20 arbres ou pièges espacés de 100 m.

ENTRETIEN DES PIEGES

Vérifier les pièges régulièrement, au moins deux fois par semaine. Remplacer les diffuseurs de phéromones toutes les 4 semaines pour obtenir des résultats optimaux.

STOCKAGE

Conserver le produit à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Conserver au réfrigérateur pour une durée de vie de 6 mois ou au congélateur pour une durée de vie prolongée de 12 mois. Toujours conserver le produit dans son emballage d'origine.

CONTENU

- Conditionnement : unité

LE PORT DE GANTS EST FORTEMENT CONSEILLÉ POUR CETTE INTERVENTION

ADULTE

Envergure de 25 à 35 mm. Les ailes antérieures sont grises avec des marques blanches et grises plus foncées. Les ailes postérieures sont blanches, chacune avec une ligne transversale large et peu marquée.

LARVE

Les larves nouvellement écloses sont uniformément brunes avec une tête foncée. La couleur du corps s'éclaircit au fur et à mesure que la larve mûrit. Les derniers stades larvaires sont gris avec une tête noire et une seule bande foncée le long du dos. Des touffes de longs poils blancs partent de pinacles verruqueux orangés sur toute la longueur du corps.

ŒUFS

Déposés en rangs pour former une plaque et recouverts d'écailles grisâtres sur les rameaux et les petites branches de la canopée.

RÉPARTITION

Europe et Moyen-Orient

HOTES ÉCONOMIQUES

Principalement le chêne (*Quercus*) et parfois le hêtre (*Fagus*), le bouleau (*Betula*) et l'aubépine (*Crataegus*).

SYMPTÔMES


Les premiers stades se nourrissent ensemble de feuilles et se cachent dans le sol et la litière de feuilles. Les stades ultérieurs forment un nid commun en soie. Les larves qui se nourrissent squelettisent les feuilles. Les larves matures quittent l'arbre en ligne pour trouver un site de nymphose. Les poils urticants des larves provoquent des irritations et des réactions allergiques chez l'homme et les animaux domestiques.



COMPLETEZ VOTRE INSTALLATION

FRANCAIS

FR



Complétez votre installation anti-nuisibles grâce à notre simulateur sur notre site internet

<https://nuisicapt.fr>