



Thaumetopoea pityocampa
Batch: 10106/13894
D.o.M: 22/04/2024



MODE D'EMPLOI



Phéromone sexuelle qui permet de réduire progressivement la population en diminuant le nombre d'accouplements par la capture des papillons mâles.

Leurre standard 1 mg
Détails du distributeur :
Septum en caoutchouc naturel

Durée de vie active :
4-6 semaines (en fonction de la température)

SURVEILLANCE

Présence d'adultes. Juillet à août (en fonction du climat).

DENSITÉ DES PIEGES RECOMMANDÉS

1 piège pour 3-4 arbres dans les groupes d'arbres ou 1 piège par arbre si les arbres sont peu nombreux.

ENTRETIEN DES PIEGES

Vérifier les pièges régulièrement, au moins deux fois par semaine. Il est recommandé de remplacer les diffuseurs de phéromones toutes les 4 semaines pour obtenir des résultats optimaux. Remplacer les inserts collants lorsqu'ils sont saturés de poussière ou d'insectes.

STOCKAGE

Conserver le produit à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Conserver au réfrigérateur pour une durée de vie de 12 mois ou au congélateur pour une durée de vie prolongée de 18 mois. Toujours conserver le produit dans son emballage d'origine.

CONTENU

- Conditionnement : unité

LE PORT DE GANTS EST FORTEMENT CONSEILLÉ POUR CETTE INTERVENTION

ADULTE

Envergure de 36 à 49 mm chez la femelle et de 31 à 39 mm chez le mâle. Les ailes antérieures sont gris cendré avec des veines et des marges plus foncées et trois bandes transversales. Les ailes postérieures sont blanches, frangées de gris avec une tache sombre dans le coin inférieur gauche.

LARVES

Les premiers stades sont vert terne. Les derniers stades atteignent 40 mm de longueur avec un corps de couleur variable, allant du gris bleuâtre terne au noir. Des taches de poils rouges sont présentes sur le dessus de chaque segment abdominal. La tête est noire.

ŒUFS

Les œufs sont pondus en masses recouvertes de touffes d'écailles sur la partie inférieure des arbres.

RÉPARTITION

Afrique du Nord, Moyen-Orient et Europe du Sud.

HOTES ECONOMIQUES

Pin (Pinus) et cèdre (Cedrus)

SYMPTOMES/SIGNES


Les larves forment des nids de soie et se nourrissent des aiguilles et des rameaux proches du nid, ce qui provoque un brunissement et un jaunissement des aiguilles. Les larves quittent l'arbre en ligne pour trouver un site de nymphose. Les poils urticants des larves provoquent des irritations et des réactions allergiques chez l'homme et les animaux domestiques.



COMPLETEZ VOTRE INSTALLATION

FRANCAIS

FR



Complétez votre installation anti-nuisibles grâce à notre simulateur sur notre site internet

<https://nuisicapt.fr>